



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

# VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

## CHOLERA

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Risques</b>              | Symptômes                                       | Diarrhées, fièvre, céphalées, paralysies, spasmes...   |
|                             | Incubation                                      | 1 à 5 jours  |
|                             | Modes de transmission habituels                 | Eau ou aliments contaminés   |
| <b>Hygiène</b>              | Localisation géographique                       | Afrique (Rwanda), Asie   |
|                             | Recommandations                                 | Voyageurs longues durées   |
| <b>Protection vaccinale</b> | Obligations vaccinales et travail               | Aucune depuis 1993   |
|                             | Modalités des premières injections              | 2 doses buvables à 8 jours d'intervalle  |
|                             | Premier rappel                                  | -  |
|                             | Rappels suivants                                | -  |
|                             | Schéma accéléré                                 | -  |
|                             | Délai d'apparition de l'immunité vaccinale      | Vaccin peu efficace pas plus de 50%  |
|                             | Principales contre-indications à la vaccination | Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers<br>→ voir le médecin traitant |
|                             | Principaux effets indésirables                  | Rares réactions douloureuses<br>Rares réactions allergiques  |
|                             | Principaux vaccins                              | DUKORA ®   |
| Conservation                | +2 à +8°  |  |