



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

COQUELUCHE

Risques	Symptômes	Toux, fièvre. (La maladie peut être mortelle chez le nourrisson non ou incomplètement vacciné.)
	Incubation	7 jours
	Modes de transmission habituels	- Voies respiratoires (toux) - Forme atypique de la maladie chez l'adulte pouvant contaminer les Nouveaux nés non encore vaccinés (< 4 mois)
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	Certains professionnels de santé au contact de nourrissons non vaccinés. (personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatalogie, tout service de pédiatrie en charge des nourrissons < 6 mois Adultes susceptibles de devenir parents dans les mois ou années à venir → Ni l'infection ni la vaccination ne sont immunisante à vie + + +
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Aucune
	Modalités des premières injections	1 injection IM
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	Tous les 10 ans (tous les 2 ans si épidémie)
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	-
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Nodules locaux
	Principaux vaccins	PENTAVAC ® REPEVAX ® (dCaTP) BOOSTRIXETRA ®
	Conservation	+2 à +8°