



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

DIPHTERIE

Risques	Symptômes	Angine avec fièvre, fatigue. Fausses membranes blanches. « Croup » et paralysies.
	Incubation	2 à 5 jours
	Modes de transmission habituels	Voies respiratoires (toux...)
Hygiène	Localisation géographique	Zone d'endémie
	Recommandations	Voyageurs en zone d'endémie Ex-Urss, sous continent indien, Asie du Sud-est Afrique.
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Articles R 3111-4 et R 3116-3 du C.S.P. Arrêtés du 15.03.91 et 29.03.2005 (liste des établissements) et du 06.03.2007 (conditions d'immunisation)
	Modalités des premières injections	2 injections IM à un mois d'intervalle. Toujours associée à l'anatoxine tétanique.
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	Tous les 10 ans (dose réduite d'anatoxine diphtérique)
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	Après la 2ème injection. Immédiatement en cas de rappel.
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Rares réactions douloureuses. Rares réactions allergiques.
Principaux vaccins	REVAXIS® (dTP) REPEVAX® (dTPCa) BOOSTRIX-TETRA® (dTPCa)	
Conservation	+2 à +8°	