



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

# VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

(Octobre 2010)

## ENCEPHALITE A TIQUES

<b>Risques</b>	Symptômes	Fièvre
	Incubation	1 à 15 jours
	Modes de transmission habituels	Piqûre de tiques
<b>Hygiène</b>	Localisation géographique	Europe Centrale, Orientale et du Nord
	Recommandations	Zone rurale en Europe centrale, orientale et du nord au printemps et été Séjours longues durées et hygiène précaire.
<b>Protection vaccinale</b>	Obligations vaccinales et travail	Néant
	Modalités des premières injections	2 injections IM : Mois 0 Mois 1
	Premier rappel	9 à 12 mois après M1
	Rappels suivants	3 à 5 ans
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	15 jours après M1
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	- Fièvre. - Réactions locales.
	Principaux vaccins	TICOVAC ®
	Conservation	+2 à +8°