



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

ENCEPHALITE JAPONAISE

	Symptômes	Atteinte neurologique
Risques	Incubation	
	Modes de transmission habituels	Piqûre de moustique
	Localisation géographique	Asie S-E, Chine, Océanie. Inde.
Hygiène	Recommandations	Zone rurale en saison des pluies dans ces pays.
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Néant
	Modalités des premières injections	J0 J7 centre de vaccination agréé J30
	Premier rappel	1 an
	Rappels suivants	3 ans
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	10 à 14 jours après la 3 ^e injection
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	- Rare diarrhées - Effets loco-régionaux
	Principaux vaccins	JEVAX ®
	Conservation	+2 à +8°