



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

(Octobre 2010)

FIEVRE JAUNE

Risques	Symptômes	Maux de tête, fièvre, vomissements, jaunisse
	Incubation	3 à 6 jours
	Modes de transmission habituels	peau
Hygiène	Localisation géographique	Zone intertropicale d'Afrique ou d'Amérique du Sud
	Recommandations	Voyageurs en zone d'endémie
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Obligatoire au passage de certaines frontières : Guyane française
	Modalités des premières injections	Uniquement dans les centres agréés 1 injection SC
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	10 ans
	Schéma accéléré	Au moins 10 jours avant le départ
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	10ème jour après primo-injection, Immédiatement en cas de rappel datant de moins de 10 ans car persistance > 10 ans → sérologie des anticorps utile
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	- Fièvre - Réactions locales
	Principaux vaccins	STAMARIL ®
Conservation	+2 à +8°	