



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

GRIPPES A / SAISONNIERE

Risques	Symptômes	Fièvre brutal > 38°, écoulement nasal, toux, courbatures, maux de tête, fatigue...
	Incubation	4 à 7 jours
	Modes de transmission habituels	- Directe : microgouttelettes. - Indirecte : mains ou objets souillés. - Contagiosité : 2 jours avant et 6 jours après l'apparition des symptômes
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	- Pour les > 60 ans - Bon de prise en charge S. S. pour : > 65 ans, ALD (diabète 1 et 2, AVC, Insf cardiaque et respiratoire graves...), <u>asthme</u> , <u>BPCO</u> . - Sujets y compris les femmes enceintes atteints des maladies suivantes : Cardiovasculaire, Insuffisance rénale, diabète non équilibré, Immunodépressifs dont VIH... - Professionnels de santé en contact régulier et prolongé avec sujets à risque - Voyages en groupe (bateaux de croisière et avions). - Etablissement de soins et de prévention ; + Etudiants - Contact du public régulier et prolongé. - Personnels de l'industrie des voyages (guides). - Personnels naviguant des bateaux et des avions.
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Néant
	Modalités des premières injections	Injection unique IM en octobre-novembre
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	-
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	10ème jour
	Principales contre-indications à la vaccination	Fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	- Réactions locales fréquentes : douleurs, rougeurs, ecchymose, gonflement, indurations. - Fièvre, fatigue, sueurs. - Céphalées. - Choc allergique grave (rare).
	Principaux vaccins	FLUARIX® INFLUVAC® MUTAGRIP® VAXIGRIP®
Conservation	+2 à +8°	

