



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

# VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

## HEPATITE A/E

<b>Risques</b>	Symptômes	Asymptomatique souvent Fièvre, maux de tête, douleurs abdominales, courbatures, fatigue.
	Incubation	15 à 50 jours
	Modes de transmission habituels	- Contact directe (mains souillées par les selles). - Alimentaire (crustacés, eau, légumes, mollusques).
<b>Hygiène</b>	Localisation géographique	Zone d'endémie (Afrique, Asie, Amérique Centrale et latine, Europe de l'Est) . Voyage dans pays à hygiène précaire, sans équipement sanitaire.
	Recommandations	- Patient infecté chronique par virus hépatite B. - Professionnels : Crèches, établissement et services pour l'enfance, la jeunesse handicapée. - Traitement des eaux usées, station d'épuration. - Restauration collective, - Déplacement à l'étranger (pays tropicaux et subtropicaux, Afrique et Amérique latine.
<b>Protection vaccinale</b>	Obligations vaccinales et travail	Néant
	Modalités des premières injections	Injection unique. IM Faire sérologie avant si antcd d'ictère ou né < 1945 (une injection un mois après pour TWINRIX uniquement)
	Premier rappel	6 mois à 1 an (jusqu'à 3 ans) après la première injection
	Rappels suivants	Tous les 10 ans
	Schéma accéléré	TWINRIX T 0 T1: 7jours T2: 21jours T3 : 12mois
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	15-30 jours
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Douleur locale transitoire. Rare fièvre, nausées, vertiges
	Principaux vaccins concernant l'hépatite B Pas de vaccin pour l'hépatite E	HAVRIX® TWINRIX® (avec Hépatite B) TYAVAX® (avec typhoïde) AVAXIM®
Conservation	+2 à +8°	