



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

# VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

## HEPATITE B/C/D

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>Risques</b>              | Symptômes  | Fièvre, maux de tête, courbatures, fatigue  |
|                             | Incubation   | 50 à 150 jours  |
|                             | Modes de transmission habituels  | Voie sanguine ou sexuelle   |
| <b>Hygiène</b>              | Localisation géographique  | Asie, Amérique centrale, Afrique sub-saharienne.  |
|                             | Recommandations  | Séjours dans pays à forte prévalence<br>Professionnels : pompiers, secouristes, égoutiers, éboueurs, gardiens d'immeuble, agents de nettoyage...  |
| <b>Protection vaccinale</b> | Obligations vaccinales et travail  | Articles R 3111-4 et R 3116-3 du C.S.P.<br>Arrêtés du 15.03.91 et 29.03.2005 (liste des établissements) et du 06.03.2007 (conditions d'immunisation)<br>Résultat du dosage des Ac anti-HBs selon l'âge, > 13 ans ou < 25 ans en fonction de la profession |
|                             | Modalités des premières injections   | 2 injections IM à un mois d'intervalle  |
|                             | Premier rappel   | 6 mois  |
|                             | Rappels suivants   | <u>Inutile</u> si bien immunisé.<br>Si risque professionnel : Faire une sérologie. (voir ci-dessus)<br>Si insuffisance rénale chronique dialysé : faire sérologie annuelle et rappel si Ac anti-HBs < 10 U  |
|                             | Schéma accéléré  | Mois 1 Mois 2 Mois 3<br>ou<br>T 0 T 7 jours T 21 jours T 12 mois  |
|                             | Délai d'apparition de l'immunité vaccinale   | Dès la deuxième injection ; Immédiatement en cas de rappel  |
|                             | Principales contre-indications à la vaccination                                    | Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers<br>→ voir le médecin traitant  |
|                             | Principaux effets indésirables   | Douleur locale transitoire.<br>Fièvre, myalgies, vertiges   |
|                             | Principaux vaccins concernant l'hépatite B<br>Pas de vaccin pour l'hépatite C et D | ENGERIX B® FENDRIX ®<br>GENHEVAC® HB VAXPRO ®<br>TWINRIX® Adulte (avec Hépatite A).   |
|                             | Conservation   | +2 à +8°  |