



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

LEPTOSPIROSE

Risques	Symptômes	Fièvre, jaunisse
	Incubation	7 à 13 jours
	Modes de transmission habituels	Contact cutanéomuqueux avec eaux souillées
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	<ul style="list-style-type: none">- Personnels des abattoirs- Pêcheurs professionnels.- Employés de laiterie.- Plongeurs en eau douce- Pisciculture en eau douce- Travaux dans les égouts, station d'épuration, curage et entretien de canaux,- Employés de voirie.- Agriculteurs.
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Egoutiers de Paris
	Modalités des premières injections	2 injections SC à 15 jours d'intervalle
	Premier rappel	6 mois
	Rappels suivants	<u>2 ans</u>
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	15 jours après 2ème injection
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Rougeur Fièvre
	Principaux vaccins	SPIROLEPT®
Conservation	+2 à +8°	