



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

MENINGITE C

Risques	Symptômes	Fièvre, maux de tête, raideur de la nuque
	Incubation	2 à 10 jours
	Modes de transmission habituels	Voies aériennes (contacts rapprochés)
Hygiène	Localisation géographique	Afrique sub-saharienne, Asie
	Recommandations	Sujets en contact
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Obligatoire pour la Mecque ou Médine
	Modalités des premières injections	1 injection IM
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	-
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	10 à 14 jours après vaccination
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre
	Principaux vaccins	Meningitec® (Wyeth-Léderlé) Meninvact® (Aventis Pasteur MSD) Menjugate® (Socopharm)
Conservation	+2 à +8°	