



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

MENINGITE A MENINGOCOQUE A+C et A+C+W135+Y

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Risques | Symptômes | Fièvre, maux de tête, raideur de la nuque |
| | Incubation | 2 à 10 jours |
| | Modes de transmission habituels | Voies aériennes (contacts rapprochés) |
| Hygiène | Localisation géographique | Afrique sub-saharienne, Asie |
| | Recommandations | A + C : Voyage en zone d'épidémie, en zone d'endémie (ceinture méningitidique de l'Afrique) lors de la saison de transmission, si contact étroit avec la population. A + C + W135 + Y : Voyage dans une zone à risque avéré de W135. |
| Protection vaccinale | Obligations vaccinales et travail | Obligatoire pour la Mecque ou Médine |
| | Modalités des premières injections | 1 injection IM Centre agréé pour MENOMUNE® |
| | Premier rappel | 3 ans |
| | Rappels suivants | <u>3 ans</u> |
| | Schéma accéléré | - |
| | Délai d'apparition de l'immunité vaccinale | 10 jours |
| | Principales contre-indications à la vaccination | Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant |
| | Principaux effets indésirables | Réaction locale Fièvre |
| | Principaux vaccins | MENOMUNE® (A+C+W135+Y) Vaccin méningococcique A+C |
| Conservation | +2 à +8° | |