



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

PNEUMOCOQUE

Risques	Symptômes	Fièvre, maux de tête
	Incubation	2 à 10 jours
	Modes de transmission habituels	Voies aériennes (contacts rapprochés)
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	Sujets en contact
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Articles R 3111-4 et R 3116-3 du C.S.P. Arrêtés du 15.03.91 et 29.03.2005 (liste des établissements) et du 06.03.2007 (conditions d'immunisation)
	Modalités des premières injections	2 injections IM à un mois d'intervalle
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	Tous les 10 ans
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	Dès la 2 ^{ème} injection. Immédiatement en cas de rappel
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre
	Principaux vaccins	PNEUMO 23®
Conservation	+2 à +8°	