



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

POLIOMYELITE

Risques	Symptômes	Fièvre, troubles digestifs, douleurs musculaires, paralysie, fonte musculaire.
	Incubation	4 à 35 jours
	Modes de transmission habituels	Eaux, aliments ou linges souillés par les selles
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	Sujets en contact
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Néant
	Modalités des premières injections	1 injection IM
	Premier rappel	3 à 5 ans
	Rappels suivants	3 à 5 ans
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	2 à 3 semaines
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre
	Principaux vaccins	REVAXIS® REPEVAX® BOOSTRIX-TETRA®
Conservation	+2 à +8°	