



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

RAGE

Risques	Symptômes	Fièvre, irritabilité, maux de tête, paralysies, spasmes et décès
	Incubation	15 jours à 8 semaines
	Modes de transmission habituels	Contact direct avec animal infecté
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	- Professionnels exposés : Vétérinaires, forestiers, personnels de laboratoire, abattoirs, fourrières - Chasseurs, séjours dans zone de rage endémique (Afrique, Asie, Amérique du Sud), séjours dans zone de rage commune.
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Néant
	Modalités des premières injections	3 injections IM à J0 J7 J28
	Premier rappel	1 an
	Rappels suivants	3 ans
	Schéma accéléré	J0 J7 J21
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	environ 3 semaines
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre, maux de tête
	Principaux vaccins	RABIPUR® Vaccin Rabique®
Conservation	+2 à +8°	