



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

ROUGEOLE

Risques	Symptômes	Fièvre > 38°5, éruption maculo-papuleuse, toux, coryza, conjonctivite...
	Incubation	10 jours
	Modes de transmission habituels	Voies respiratoires
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	- Calendrier vaccinal. - Les personnes nées entre 1980 et 1991 jamais vaccinées doivent recevoir une dose de vaccin trivalent ROR. - Professionnels de santé de plus de 25 ans non vaccinés ou sans antcd de rougeole.
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Aucune
	Modalités des premières injections	1 injection SC
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	-
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	immédiate
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre, maux de tête
	Principaux vaccins	ROR® PRIORIX®
Conservation	+2 à +8°	