



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

RUBEOLE

Risques	Symptômes	Aucun mais contamination fœtale chez femme non immunisée infectée pendant sa grossesse (SNC, œil, C-V).
	Incubation	15 jours
	Modes de transmission habituels	Voies respiratoires
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	Calendrier vaccinal. - Femmes en âge de procréer non vaccinées. Si sérologie prénatale négative ou inconnue, vaccination immédiatement après accouchement. - Personnels de santé - Personnels en contact avec enfants (crèches, enseignants)
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	(Rappel : Décret 96-364 : si risque d'exposition à la rubéole au travail : interdiction aux femmes enceintes.)
	Modalités des premières injections	1 injection (faire sérologie avant avec taux d'Anti corps = 0). Salariée sous CO dans les 2 mois suivant la vaccination.
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	Tous les 10 ans. Mais possibilité d'un rappel unique si dernière injection < 20 ans. *
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	2 à 4 semaines
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre, maux de tête
	Principaux vaccins	ROR®
Conservation	+2 à +8°	