



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

TETANOS

Risques	Symptômes	Difficultés à avaler, contracture des mâchoires et des membres. Mortel une fois sur trois, peut laisser de graves séquelles
	Incubation	Quelques heures à quelques jours
	Modes de transmission habituels	Plaies, ulcérations.
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	Voyageurs, Egoutiers, Eaux usées, Contact avec la terre (jardinage, bricolage)... Sujets âgés
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Articles R 3111-4 et R 3116-3 du C.S.P. Arrêtés du 15.03.91 et 29.03.2005 (liste des établissements) et du 06.03.2007 (conditions d'immunisation)
	Modalités des premières injections	2 injections IM à un mois d'intervalle.
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	Tous les 10 ans ; Possibilité d'un rappel unique quelque soit l'ancienneté du dernier rappel à condition d'une vaccination complète dans l'enfance (3 +1)
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	Dès la 2ème injection. Immédiatement en cas de rappel.
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre, maux de tête
	Principaux vaccins	REVAXIS® REPEVAX® BOOSTRIX-TETRA®
Conservation	+2 à +8°	