



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

TUBERCULOSE

Risques	Symptômes	Fièvre, tous, expectoration
	Incubation	4 à 12 semaines
	Modes de transmission habituels	Voies aériennes
Hygiène	Localisation géographique	Tous pays
	Recommandations	- Peu d'intérêts chez l'adulte non exposé - Personnels de santé, - Abattoirs, boucheries, contact animaux
Protection vaccinale	Obligations vaccinales et travail	Article L 3112-1 et L 3112-2 CSP : (sans limite d'âge) Articles R 3112-1C et R 3112-2 CSP - Personnes au contact des moins de 6 ans dans école, pouponnières, assistantes maternelles... - Personnels des établissements pénitentiaires. - Etudiants des professions à caractère sanitaire et social (animateurs, éducateurs). - Laboratoire d'analyses de biologie médicale, - Personnels soignants dans certaines structures : hôpitaux, HAD, foyers, centres d'hébergements, établissements de santé... → Preuve écrite ou cicatrice.
	Modalités des premières injections	1 injection ID stricte
	Premier rappel	Décret du 30 juin 2004 et Arrêté du 13 juillet 2004 + circulaire n°DGS du 11 octobre 2004: Suppression de l'obligation de revaccination par le BCG si IdR négative.
	Rappels suivants	Indications de l'IdR (Tubertest®) : <ul style="list-style-type: none"> • Test de surveillance des professionnels exposés. • Aide au diagnostic de tuberculose • Dans l'enquête d'un cas de tuberculose • Avant primo-vaccination.
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	Deux mois
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre, maux de tête
	Principaux vaccins	BCG SSI®
	Conservation	+2 à +8°

