



ASSOCIATION MÉDICALE INTERENTREPRISES

ASSOCIATION LOI 1901

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

SANTÉ AU TRAVAIL

# VACCINATION CONTRE LES PRINCIPAUX RISQUES INFECTIEUX POUVANT ETRE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Octobre 2010

## TYPHOIDE

<b>Risques</b>	Symptômes	Fièvre, diarrhée, insomnies, vertiges
	Incubation	15 jours
	Modes de transmission habituels	Alimentaires (légumes, coquillages, œufs, lait)
<b>Hygiène</b>	Localisation géographique	Afrique, Asie, Amérique Centrale et du Sud. Voyage dans pays à hygiène précaire.
	Recommandations	- Voyageurs en zone d'endémie - Séjours prolongés ou dans de mauvaises conditions.
<b>Protection vaccinale</b>	Obligations vaccinales et travail	Art L 3111-4 CSP alinéa 4 - Personnels de santé... - Personnels de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
	Modalités des premières injections	1 injection unique IM ou SC
	Premier rappel	-
	Rappels suivants	Tous les 3 ans
	Schéma accéléré	-
	Délai d'apparition de l'immunité vaccinale	15 jours
	Principales contre-indications à la vaccination	Grossesse, fièvre, allergie aux composants du vaccin, maladies ou traitements particuliers → voir le médecin traitant
	Principaux effets indésirables	Réaction locale Fièvre, maux de tête
	Principaux vaccins	TYPHIM® TYIPHERIX® TYAVAX® (avec hépatite A)
Conservation	+2 à +8°	